

Unique profile for smart solutions



o·b·e·r·o·n®
SMART PERFORMANCE!

أوبيرون ٢٤٠
مركز معلق

- Outstanding control of whiteflies and spidermites with long-lasting efficacy
مكافحة فائقة للذباب الأبيض والعناكب مع فعالية طويلة الأمد.
- Ketoenol chemistry with no cross-resistance to current products
تركيبة كيميائية حديثة مع عدم وجود مقاومة عبورية مع المركبات الحالية.
- Friendly to beneficials and pollinators
آمن على البيئة والمحشرات النافعة والملحقات.
- Perfect fit with IPM programs
يتواافق تماماً مع برامج المكافحة المتكاملة.

الوكيل بجمهورية مصر العربية
ماي تريد ش.م.م



العنوان: ١٤ شارع كلية الزراعة - الجيزة
تليفون: ٣٥٧٠٣٥٦٦



Bayer CropScience

أوبيرون ٤٠ مركز معلق

مبيد حشري جديد غير جاهزي يتبع المجموعة الكيميائية الجديدة (حمض التترونيك) و يمتاز بفعالية فائقة ضد الذباب الأبيض وأنواع الأكاروس المختلفة في الحضروات.

أوبيرون في صورة معلق مركز يحتوى على ٤٠ جرام مادة فعالة سبيروميسيفين.

أوبيرون غير سام للنحل وللطيور و ديدان الأرض إذا استخدم طبقاً للتوصيات الموضحة.

أوبيرون يمتاز بطريقة تأثير جديدة حيث يثبط تخليل التراي جليسيريد والدهون الحرة في الخضرات والأكاروس وبذلك يقضى على السلالات المقاومة من الذباب الأبيض والأكاروس والتي لا يمكن مكافحتها بالبيادات التقليدية الأخرى.

Unique profile for smart solutions

المواصص والمميزات :

- مجموعة كيميائية جديدة، طريقة تأثير نموذجية تستهدف مركز تخليل الدهون مما يؤدي إلى كسر المناعة.

- له أثر باقي طويل و متد نظراً لشدة الالتصاق على الأوراق (٧ - ١٠ أيام).

- آمن بالنسبة للبيئة ولا يتأثر بالظروف الجوية الغير ملائمة (الحرارة الرطوبة، الأمطار).

- مرنة في التطبيق وفعالية فائقة ضد أنواع الذباب الأبيض وكذلك كل أطواره من الحلم والأكاروس ذات الأهمية الاقتصادية (الأكاروس الأحمر فصيلة الأكاروس الدودي) ففعالية فائقة على خفض نسبة وضع البيض وأيضاً على نسبة الفقس.

- مبيد حشري متميز للإستخدام في محاصيل الخضروات والبقول والذرة والقطن ونباتات الزينة ويكافح أيضاً البисلا ونطاطات الأوراق.

- مناسب تماماً للإستخدام ضمن برامج المكافحة المتكاملة.

- فترة ماقبل الحصاد مناسبة طبقاً لاحتياجات المزارعين.

الإستعمال طبقاً للتوصيات وزارة الزراعة :

أوبيرون ٤٠ SC مبيد حشري باللامسة (تبسيط التخليل الحيوي للدهون) يستخدم لمكافحة:

الخيار: لمقاومة حشرة الذابة البيضاء بمعدل ٤٠ سم^٣/فدان (٤٠ لتر ماء للفدان)

الباذنجان: لمقاومة العنكبوت الأحمر بمعدل ٥٠ سم^٣/١٠٠ لتر ماء

فترة ما قبل الحصاد (PHI) :

خيار: ٣ أيام باذنجان: ٧ أيام

موعد الإستعمال و عدد الرشات وإدارة المقاومة (المناعة) الخضرية للمبيدات :

للحصول على أفضل النتائج فإننا ننصح بالمبادرة بالرش في بداية أول ظهور للذابة البيضاء والعنكبوت على النباتات وقبل تطورها إلى أعداد كبيرة و قبل حدوث أضرار أو تغير لون النبات بفعل الإصابة. كما ينصح بعدم تكرار رش أوبيرون أكثر من مرتين ضد العنكبوت و لا أكثر من ثلاثة مرات لمكافحة الذابة البيضاء في الموسم الواحد على أن يستعمل أوبيرون بالتعاقب مع مركبات أخرى تختلف في طريقة التأثير.

احتياطات عامة :

للحصول على أفضل نتائج للمكافحة في جميع المحاصيل

- ينصح بالتلطيم الجيدة للأسطح العليا والسفلى للأوراق وجميع الأجزاء النباتية المعرضة للإصابة بواسطة محلول الرش.

- لا ينصح برش أوبيرون بإستخدام أجهزة أونظم الري بالتنقيط أو الري المخوري.

- لا ينصح بإستخدام الماء الذي يحتوي على نسبة عالية من الأملاح أو ماء تزيد درجة حموضته على ٨ لتحضير محلول الرش.

- يجب البدء في الرش في الصباح المبكر أو قبل الغروب عندما تنخفض درجة الحرارة وتقل شدة أشعة الشمس المباشرة.

القابلية للخلط :

يمكن خلط أوبيرون مع العديد من المبيدات الفطرية والخشبية والعناصر الغذائية و يجب الإلتزام بالتعليمات المدونة على العبوات وبصفة عامة يجب عمل جزيرة إيضاحية مصغرة لاختبار قابلية الخلط من عدمها و عموماً جنب الخلط مع المواد النافثة والمبيدات التي على هيئة محلول مركز (EC formulations).

لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني :